

ANEXO 2

EFFECTOS EN SALUD DE LOS RP

Residuo Peligroso	Efectos en salud
Sólidos: Breas, escorias, carbón activado y metales pesados	Deficiencia neurológica persistente, atrofia cerebral, anorexia, pérdida de pelo y uñas, daño renal, cirrosis, cáncer de la piel, pulmonar, de las cavidades nasales, de senos, tráquea, de bronquios y de estomago, temblores, gingivitis, delirio, insomnio, parálisis, pérdida de la memoria, pérdida auditiva, abortos, muerte neonatal, aumento de la mortalidad..
Solventes	Daño hepático y renal, convulsiones, cefalea, daños hepáticos y visuales, pérdida de memoria, neuropatía periférica, arritmia y muerte causada por paro respiratorio.
Aceites gastados	Dermatitis, dolor de cabeza, náuseas, alteraciones del sistema nervioso, asma, temblores, parálisis, cáncer de la piel y muerte
Bifenilos policlorados (BPC's)	Hiperpigmentación (en dorso de la mano y articulaciones de los dedos y las matrices de las uñas), edema, aumento en presión sanguínea, pérdida de peso, bronquitis, pérdida de memoria, debilidad, fatiga, impotencia, aumento de triglicéridos y disminución de la capacidad vital forzada y cirrosis

Fuente: Un Sistema para la Prevención, Valoración y Control de las exposiciones a Sitios Peligrosos y sus Efectos en la Salud. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, Programa de Salud Ambiental, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Metepec, Estado de México.